

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN:

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan:

- Prevalensi persistensi gigi sulung anterior terbanyak ditemukan pada umur 7-8 tahun yaitu sebanyak 67 anak atau sebesar 40,61%.
- Prevalensi persistensi gigi sulung anterior banyak terjadi pada anak laki-laki yaitu sebanyak 84 anak atau sebesar (13,46%) dibandingkan anak perempuan sebanyak 66 anak atau sebesar (14,22%)
- Persistensi gigi sulung anterior banyak didapatkan pada rahang atas (55,33%) dibandingkan pada rahang bawah(44,67%).
- Posisi persistensi gigi sulung anterior pada umumnya masih banyak terletak dalam lengkung gigi.

SARAN:

- Pada anak-anak yang sedang mengalami masa geligi pergantian (umur 7-12 tahun) sebaiknya dilakukan tindakan pemeriksaan rutin 6 bulan sekali sebagai salah satu usaha untuk menemukan kasus persistensi gigi sulung secara dini.
- Perlunya memberikan penyuluhan kepada orang tua tentang kesehatan gigi agar orang tua lebih memperhatikan waktu erupsi gigi permanen anak dan dapat mencegah terjadinya persistensi yang juga akan dapat mengurangi adanya kasus maloklusi